

ANEXO I. ESTADIFICACIÓN TNM CÁNCER DE MAMA

Tumor primario (T)	
Tx	No puede evaluarse el tumor primario
T0	Sin evidencia de tumor primario
Tis	Carcinoma <i>in situ</i>
Tis (DCIS)	Carcinoma ductal <i>in situ</i>
Tis (LCIS)	Carcinoma lobulillar <i>in situ</i>
Tis (Paget's)	Enfermedad de Paget del pezón no asociada con carcinoma invasivo y/o carcinoma <i>in situ</i> (DCIS y/o LCIS) en el parénquima mamario subyacente. Si existe carcinoma en el parénquima mamario asociado a la enfermedad de Paget, se categoriza en función del tamaño del tumor del parénquima
T1	Tumor ≤ 20 mm de diámetro mayor
T1mic	Tumor ≤ 1 mm de diámetro mayor
T1a	Tumor > 1 mm, pero ≤ 5 mm de diámetro mayor
T1b	Tumor > 5 mm, pero ≤ 10 mm de diámetro mayor
T1c	Tumor > 10 mm, pero ≤ 20 mm de diámetro mayor
T2	Tumor > 20 mm, pero ≤ 50 mm de diámetro mayor
T3	Tumor > 50 mm de diámetro mayor
T4	Tumor de cualquier tamaño con extensión directa a la pared torácica y/o la piel (ulceración o nódulos cutáneos)
T4a	Extensión a la pared torácica, no incluye invasión única del músculo
T4b	Ulceración y/o nódulos satélites y/o edema (incluida piel de naranja) de la piel, que no cumpla criterios de carcinoma inflamatorio
T4c	T4c T4a y T4b
T4d	Carcinoma inflamatorio
Ganglios linfáticos regionales (N)	
Clasificación clínica (cN)	
NX	No pueden evaluarse los ganglios linfáticos regionales
N0	Sin evidencia de afectación de ganglios linfáticos regionales
N1	Adenopatías ipsilaterales móviles en los niveles I y II de la axila
N2	Adenopatías ipsilaterales en los niveles I y II de la axila fijas o formando un conglomerado; afectación de mamaria interna en ausencia de adenopatías axilares
N2a	Adenopatías ipsilaterales en los niveles I y II de la axila fijas o formando un conglomerado
N2b	Afectación de mamaria interna en ausencia de adenopatías axilares
N3	Metástasis en región infraclavicular (nivel III axilar) ipsilateral con o sin afectación de niveles I y II; o afectación de mamaria interna con adenopatías en nivel I, II axilar; o metástasis en región supraclavicular ipsilateral con o sin afectación de axila o mamaria interna
N3a	Metástasis en región infraclavicular (nivel III axilar) ipsilateral

N3b	Afectación de mama interna con adenopatías en nivel I, II axilar
N3c	Metástasis en región supraclavicular ipsilateral con o sin afectación axilar o mama interna
Clasificación patológica (pN)	
pNx	No pueden evaluarse los ganglios linfáticos regionales
pN0	Sin evidencia de afectación de ganglios linfáticos regionales
pN0(i-)	Sin afectación histológica, inmunohistoquímica (IHC) negativa
pN0(i+)	Células tumorales ≤ 0,2 mm (detectadas por H-E o IHC)
pN1	Micrometástasis o metástasis en 1-3 ganglios linfáticos axilares; y/o en mama interna con metástasis en BSGC no detectadas clínicamente
pN1mi	Micrometástasis (> 0,2 mm y/o más de 200 células, pero < 2,0 mm)
pN1a	Metástasis en 1-3 ganglios (al menos una > 2,0 mm)
pN1b	Metástasis en mama interna con micro o macrometástasis detectada en BSGC pero no clínicamente
pN1c	Metástasis en 1-3 ganglios axilares y en mama interna con micro o macrometástasis detectada en BSGC, pero no clínicamente
pN2	Metástasis en 4-9 ganglios axilares; o afectación de mama interna detectada clínicamente en ausencia de afectación axilar
pN2a	Metástasis en 4-9 ganglios axilares (al menos una > 2,0 mm)
pN2b	Afectación de mama interna detectada clínicamente en ausencia de afectación axilar
pN3	Metástasis en más de 10 ganglios axilares; o afectación infraclavicular(nivel III axilar); o afectación de mama interna ipsilateral clínicamente evidente en presencia de uno o más ganglios axilares de niveles I o II afectados; o 3 o más ganglios axilares y en mama interna con micro o macrometástasis detectadas en el ganglio centinela, pero no clínicamente
pN3a	Metástasis en más de 10 ganglios axilares (al menos una > 2,0 mm); o afectación infraclavicular (nivel III axilar)
pN3b	Afectación de mama interna ipsilateral clínicamente evidente en presencia de uno o más ganglios axilares de niveles I o II afectados; o 3 o más ganglios axilares y en mama interna con micro o macrometástasis detectadas en el ganglio centinela pero no clínicamente; o afectación supraclavicular ipsilateral
pN3c	Metástasis en ganglios supraclaviculares
Metástasis a distancia	
Mx	Metástasis a distancia no evaluadas
M0	Sin evidencia clínica o radiológica de metástasis a distancia
cM0(i+)	Sin evidencia clínica o radiológica de metástasis a distancia, pero con detección de células tumorales circulantes, en medula ósea o en otro tejido no ganglionar regional, menores de 0,2 mm
M1	Metástasis a distancia detectable clínica o radiológicamente y/o mayores de 0,2 mm histológicamente confirmadas

Tabla 9. Estadificación TNM en el cáncer de mama (4).

Estadios clínicos			
Estadio 0	Tis	N0	M0
Estadio I	T1	N0	M0
Estadio IIA	T0	N1	M0
	T1	N1	M0
	T2	N0	M0
Estadio IIB	T2	N1	M0
	T3	N0	M0
Estadio IIIA	T0	N2	M0
	T1	N2	M0
	T2	N2	M0
	T3	N1, N2	M0
Estadio IIIB	T4	N0, N1, N2	M0
Estadio IIIC	Cualquier T	N3	M0
Estadio IV	Cualquier T	Cualquier N	M1

Tabla 10. Clasificación por estadios clínicos del cáncer de mama (4).

ANEXO II. VARIABLES PACIENTES CON NORMOPESO

PESO NORMAL (IMC < 25KG/M ²)								
Nº	Edad	Talla	Peso	SC	IMC	QT	Régimen	Observaciones
1	-	176	62	1,7	20,01	-	No disponible	Fallecido
2	63	161	53	1,5	20,44	Neo	FEC-75 → Paclitaxel FEC x 4 cada 21 días (Ciclofosfamida 900mg + Epirubicina 112,50mg + Fluorouracilo 900mg) + Pegfilgrastim 6mg. Paclitaxel 120mg x 8 1,8 y 15 cada 28días	
3	50	169	59	1,68	20,65	Ady	TAC x 6 cada 21 días (Ciclofosfamida 840mg + Docetaxel 126mg + Adriamicina 84mg) + Pegfilgrastim 6mg.	
4	45	164	56	1,6	20,82	Ady	TC x 4 cada 21 días (Docetaxel 120mg + Ciclofosfamida 960mg) + Filgrastim 300mcg.	
5	74	150	47	1,4	20,88	ady	FEC-75 → Docetaxel FEC-7 cada 21 días (Ciclofosfamida 840mg + Epirubicina 105mg + Fluorouracilo 840mg). 2º ciclo a 28 días Docetaxel 105mg + filgrastim 300mcg x 4 cada 21 días	Aplazamiento 2ºciclo
6	44	167	58,7	1,6	21,04	Neo	AC → Paclitaxel AC x 4 cada 21 días (Adriamicina 102mg + Ciclofosfamida 1.020mg) Paclitaxel 128mg x 12 semanal. 5ºciclo a los 14 días	
7	47	163	56	1,6	21,07	Ady	FEC-90 → Paclitaxel FEC x 4 cada 21 días (Ciclofosfamida 960mg + Epirubicina 144mg + Fluorouracilo 960mg) Paclitaxel 128mg x 8 semanal	
8	52	161	55	1,57	21,21	Ady	TC x 4 cada 21 días (Docetaxel 117,75mg + Ciclofosfamida 942mg) + Filgrastim 300mcg.	
9	71	156	52	1,5	21,36	Ady	TC x 4 cada 21 días (Docetaxel 112,50mg + Ciclofosfamida 900mg) + Filgrastim 300mcg. Reducción dosis en el 2ºciclo (Docetaxel 90mg + Ciclofosfamida 720mg)	Reducción dosis en el 2ºciclo

10	41	170	62	1,72	21,45	Ady	TC + Trastuzumab → Trastuzumab Trastuzumab 496/372+ Docetaxel 129mg+ Ciclofosfamida 1032mg + Filgrastim 300mcg. 4 ciclos cada 21 días Trastuzumab 372mg hasta completar año	
11	55	166	60	1,67	21,77	Ady	FEC-75 → Paclitaxel + Trastuzumab → Trastuzumab FEC-75 x4 trisemanal (Ciclofosfamida 972mg + Epirubicina 121,5mg + Fluorouracilo 972mg) Paclitaxel 133,60mg+ Trastuzumab 240/120mg x 8 semanal Trastuzumab 360mg hasta completar año	
12	52	170	63	1,73	21,79	Ady	TAC x 4 cada 21 días (Ciclofosfamida 865mg + Docetaxel 129,75 + Adriamicina 86,50) + Pegfilgrastim 6mg. Reducción dosis en el 3ºciclo (Docetaxel 110,29mg + Ciclofosfamida 735,25mg + Adriamicina 73,53mg)	Reducción de dosis
13	41	171	64	1,75	21,88	Neo	Paclitaxel 262,50mg x 12 ciclos los días 1,8,15 cada 28.	
14	58	160	56,9	1,59	22,22	Ady	TC x6 trisemanal (Docetaxel 119,25mg + Ciclofosfamida 954mg) + Filgrastim 300mcg. Reducción de dosis 5º ciclo (Ciclofosfamida 810,90mg + Docetaxel 101,36mg)	Reducción de dosis 5º ciclo
15	60	164	60	1,65	22,30	Ady	TC x 6 cada 21 días (Docetaxel 123,75mg + Ciclofosfamida 990mg) + Filgrastim 300mcg	
16	51	161	58	1,6	22,37	Ady	FEC-90 → Paclitaxel FEC x 4 cada 21 días (Ciclofosfamida 960mg + Epirubicina 144mg + Fluorouracilo 960mg) + Pegfilgrastim 6 mg Paclitaxel 128mg x 8 semanal	
17	69	153	53	1,49	22,64	Ady	TC x 4 cada 21 días (Docetaxel 111,75mg + Ciclofosfamida 894mg) + Filgrastim 300mcg	

18	55	157	56	1,5	22,71	Neo	TAC x 6 cada 21 días (Ciclofosfamida 750mg + Adriamicina 75mg + Docetaxel 112,5mg)	
19	40	162	60	1,64	22,86	Ady	TAC x 6 cada 21 días (Ciclofosfamida 820mg + Adriamicina 82mg + Docetaxel 123mg) + Pegfilgrastim 6mg	
20	50	163	61	1,66	22,95	Neo	TAC x 6 cada 21 días (Ciclofosfamida 830mg + Adriamicina 83mg + Docetaxel 124,50mg) + Pegfilgrastim 6mg	
21	48	175	71	1,86	23,18	Ady	TC x 6 cada 21 días (Docetaxel 139,5mg + Ciclofosfamida 1.116mg) + Filgrastim 300mcg. Aplazamiento 3º ciclo	Aplazamiento 3º ciclo
22	69	160	60	1,62	23,43	Ady	TC x 4 cada 21 días (Docetaxel 121,50mg + Ciclofosfamida 972mg) + Filgrastim 300mcg	
23	68	165	64	1,7	23,50	ady	TAC x6 cada 21 días (Ciclofosfamida 850mg + Adriamicina85mg + Docetaxel 127,5mg) + Pegfilgrastim 6mg. Reducción 5º ciclo (Ciclofosfamida 765mg + Adriamicina 76,50mg + Docetaxel 114,75mg)	Reducción 5º ciclo
24	86	157	58	1,58	23,53	Ady	Paclitaxel 110,60mg x12 1,8, 15 cada 28 días	
25	57	162	62	1,66	23,62	Ady	TAC x 4 cada 21 días (Ciclofosfamida 830mg + Adriamicina 83mg + Docetaxel 124,50 mg) + Pegfilgrastim 6mg. A partir del 2º ciclo reducción (Ciclofosfamida 664mg + Adriamicina 66,40mg + Docetaxel 99,60mg) + Pegfilgrastim 6mg. 4º ciclo aplazado 28 días	Reducción 2ºciclo.
26	53	168	67	1,7	23,73	Ady	TAC x 6 cada 21 días (Ciclofosfamida 850mg + Adriamicina 85mg + Docetaxel 127,5mg) + Pegfilgrastim 6mg	
27	72	153	57	1,54	24,34	Ady	FEC-90→Docetaxel + Trastuzumab + Pertuzumab → Trastuzumab + Pertuzumab	

							FEC-90 x 3 cada 21 días (Ciclofosfamida 924mg + Epirubicina 138,60mg + Fluorouracilo 924mg) + Filgrastim 300mcg Docetaxel 115,5mg + Trastuzumab 456/342 + Pertuzumab 840/420mg x 4 cada 21 días Trastuzumab 342mg + Pertuzumab 420mg hasta completar el año	
28	57	160	63	1,66	24,60	Ady	TC x 4 cada 21 días (Docetaxel 124,5mg + Ciclofosfamida 996mg) + Pegfilgrastim.	Aplazamiento 5ºciclo
29	80	152	57	1,5	24,67	Neo	Docetaxel + Trastuzumab → Trastuzumab Docetaxel 112,50mg + Trastuzumab 456/342mg + Pegfilgrastim 6 mg x 6 cada 21 días. 5º ciclo reducción a Docetaxel 100mg. Trastuzumab 342mg hasta completar	Reducción dosis
30	46	153	58	1,55	24,77	ady	TAC x 6 cada 21 días (Ciclofosfamida 800mg + Adriamicina 80mg + Docetaxel 120mg) + Pegfilgrastim 6mg	
31	64	151	57	1,52	24,99	Ady	FEC → Docetaxel FEC x 4 cada 21 días. (Ciclofosfamida 1074mg + Epirubicina 161,10mg + Fluorouracilo 1074mg) + Filgrastim 300mcg. Aplazamiento 2ºciclo. Docetaxel 143,2mg x4 cada 21 días	Aplazamiento 2ºciclo En 2015 metástasis

Tabla 11. Variables de los pacientes con peso normal. Información recogida del programa de prescripción electrónica y HospiWin.

ANEXO III. VARIABLES PACIENTES CON SOBREPESO

PACIENTES SOBREPESO (IMC ≥ 25 Y < 30 KG/M ²)								
Nº	Edad	Talla	Peso	SC	IMC	QT	Régimen	Observaciones
1	55	160	64	1,67	25	Neo	Docetaxel + Trastuzumab →Trastuzumab Docetaxel 166mg + Trastuzumab 512/378mg + Filgrastim 300mcg x 6 cada 21 días Reducción docetaxel en a partir del 2º ciclo a 160mg, y en el 5º a 145mg y en el 6º a 120mg) Trastuzumab 378mg x 11 ciclos cada 21 días	Reducción posterior
2	68	160	64	1,6	25	Neo	TAC (Docetaxel 120mg, Adriamicina 80mg, ciclofosfamida 800mg) + pegfilgrastim 300mcg. Ciclos: 6 ciclos cada 21 días	
3	72	156	61	1,6	25,06	Ady	TC x 4 cada 21 días (Docetaxel 120mg + ciclofosfamida 800mg) + Filgrastim 300mcg	
4	82	162	66	1,7	25,14	ady	FEC-75 → Paclitaxel + Trastuzumab→ Trastuzumab FEC-75 (Fluorouracilo 1.020mg, Epirubicina 127,50mg, ciclofosfamida 1.020mg) x 4 cada 21 días (4ºciclo 28 días) Trastuzumab 276/138mg + Paclitaxel 136mg x 9 ciclos semanales. Trastuzumab 414mg x 9 cada 21 días → 396mg x 5 cada 21 días	Aplazamiento
5	50	163	67	1,72	25,21	ady	FEC-90 →Docetaxel FEC (Fluorouracilo 1.032mg, Epirubicina 154,80mg, ciclofosfamida 1.032mg) + filgrastim. Ciclos: 4 cada 21días Docetaxel 137,60mg + pegfilgrastim 6mg. Ciclos 4 cada 21 días	
6	54	170	73	1,84	25,25	ady	TC (Docetaxel 138mg + ciclofosfamida 1.104mg) + filgrastim. Ciclos 4 cada 21 días.	
7	57	159	64	1,66	25,31	Neo	TAC (Docetaxel 124,50mg + adriamicina 83mg +ciclofosfamida	

							830mg) + pegfilgrastim. Ciclos: 6 cada 21 días	
8	66	161	66	1,7	25,46	ady	TAC (Docetaxel 127,50mg + adriamicina 85mg +ciclofosfamida 850mg) + pegfilgrastim 6mg.Ciclos: 6 cada 21 días	
9	53	157	63	1,63	25,55	ady	TAC (Docetaxel 122,25mg + adriamicina 81,50mg +ciclofosfamida 815mg) + pegfilgrastim 6mg.Ciclos: 6 cada 21 días	
10	43	163	68	1,73	25,59	Neo	Paclitaxel →Myocet-doxorrubicina liposomal → Trastuzumab Paclitaxel 141,60mg x 17 semanal Myocet-doxorrubicina liposomal 88,50mg x6 cada 21 días Trastuzumab 408mg hasta completar año	
11	63	153	60	1,57	25,63	ady	AC → Paclitaxel Régimen ACx 4 cada 21 días (Adriamicina 79,50mg + Ciclofosfamida 795mg) + pegfilgrastim 6mg. Paclitaxel 124mg + filgrastim 300mcg x 8 semanal	Aplazamiento 2º ciclo En 2017 metástasis
12	61	153	60	1,57	25,63	ady	TC (Docetaxel 117,75mg + ciclofosfamida 942mg) + filgrastim 300mcg. Ciclo: 4 cada 21 días	
13	53	155	62	1,6	25,80	ady	TAC (Docetaxel 120mg + Adriamicina 80mg + Ciclofosfamida 800mg) + pegfilgrastim 6mg. Ciclo 5 y 6 reducción (Docetaxel 108mg + Adriamicina 72mg + Ciclofosfamida 720mg) + pegfilgrastim 6mg. Ciclos: 6 cada 21 días, excepto el 2º ciclo fue dado con un margen de 31 días.	Reducción 10% a partir del 5º ciclo.
14	72	151	59	1,54	25,87	Neo	FEC-90 →Paclitaxel Régimen FEC (Fluorouracilo 924mg + Epirubicina 138,60mg + ciclofosfamida 924mg) + filgrastim 300mcg. Paclitaxel 123,20 mg. Ciclos: 8 cada 7 días.	

15	78	152	60	1,56	25,96	ady	TC (Docetaxel 117mg + ciclofosfamida 936mg) + Filgrastim 300mcg. Ciclo: 4 cada 21 días	
16	46	163	69	1,74	25,97	ady	FEC-90 → Paclitaxel FEC-90 (Fluorouracilo 1026mg + Epirubicina 153,90mg + ciclofosfamida 1026mg) + filgrastim 300mcg. Ciclos: 4 cada 21 días Paclitaxel 139,20mg. Ciclos 8 cada 7 días	
17	61	153	61	1,58	26,05	Ady	FEC-90 → Docetaxel + Trastuzumab → Trastuzumab Régimen FEC-90 (Fluorouracilo 972mg + Epirubicina 145,80mg + ciclofosfamida 972mg) + Filgrastim 300mcg. Ciclos: 4 cada 21 días Docetaxel 128mg + Trastuzumab 504/378mg + Filgrastim 300mcg. X 4 trisemanal Trastuzumab 378mg. A partir del 4º ciclo se reduce a 366mg x 5 ciclos cada 21 días	
18	63	165	71	1,78	26,07	Neo	Paclitaxel → FEC-90 Paclitaxel albumina E.C 270mg x 12 ciclos 1,8 y 15 cada 28 días. FEC-90 (Fluorouracilo 1074mg + Epirubicina 161,10mg + ciclofosfamida 1074mg) + Filgrastim 300mcg. Ciclos: 5 cada 21 días	En 2016 metástasis
19	58	160	66,9	1,7	26,13	ady	TAC (Docetaxel 126mg + Adriamicina 84mg + Ciclofosfamida 845mg) + Pegfilgrastim 6mg. Ciclos: 6 cada 21 días	
20	82	154	62	1,6	26,14	Neo	FEC -75 → Paclitaxel FEC-75(Fluorouracilo 960mg + Epirubicina 120mg + ciclofosfamida 960mg) + Filgrastim 300mcg x 4 cada 21 días Paclitaxel 128mg. Ciclos 8 cada 7 días	
21	50	160	67	1,7	26,17	neo	TAC (Docetaxel 129mg + Adriamicina 86mg + Ciclofosfamida 860mg) + Pegfilgrastim 6mg. Ciclos: 6 cada 21 días. En el ciclo 6º reducción de dosis (Docetaxel	Reducción de dosis 6º ciclo

							127,5mg + Adriamicina 85mg + Ciclofosfamida 850mg + Pegfilgrastim 6mg)	
22	51	167	73	1,82	26,17	Ady	TAC (Docetaxel 136,50mg + Adriamicina 91mg + Ciclofosfamida 910mg) + Pegfilgrastim 6mg. Ciclos: 6 cada 21 días.	
23	78	155	63	1,62	26,22	Ady	FEC 75→Paclitaxel FEC-75 (Fluorouracilo 984mg + Epirubicina 123mg + ciclofosfamida 984mg) + Filgrastim 300mcg. x3 cada 21 días Paclitaxel 129,6mg. x 8 cada 7 días	
24	76	155	63	1,62	26,22	Ady	FEC-75→ Paclitaxel 70 Régimen FEC (Fluorouracilo 972mg + Epirubicina 121,50mg + ciclofosfamida 972mg). Ciclos: 4 cada 21 días Paclitaxel 113,4mg. x8 cada 7 días	Reducción inicial
25	57	155	63	1,62	26,22	Ady	Docetaxel + Trastuzumab → Trastuzumab Trastuzumab 378mg + Docetaxel 121,50mg + Pegfilgrastim 6mg. 4 ciclos cada 21 días. Trastuzumab 378mg x12 cada 21 días	
26	60	151	60	1,56	26,31	Ady	FEC-75 → Docetaxel + Trastuzumab → Trastuzumab FEC-75 (Fluorouracilo 900mg + Epirubicina 112,50mg + ciclofosfamida 900mg). Ciclos: 4 cada 21 días Docetaxel 124mg + Trastuzumab 480/360mg + Pegfilgrastim 6mg. Ciclos 4 cada 21 días Trastuzumab 360mg. Ciclo: 14 cada 21 días.	
27	65	163	70	1,76	26,34	Ady	FEC-90 →Paclitaxel FEC (Fluorouracilo 1056mg + Epirubicina 158,40mg + ciclofosfamida 1056mg) + Filgrastim 300mcg. Ciclos: 4 cada 21 días, excepto 3ºciclo 28 días. Paclitaxel 140,80mg x 8 semanal	Aplazamiento

28	51	172	78	1,91	26,36	Neo	TAC (Docetaxel 143,25mg + Adriamicina 95,50mg + Ciclofosfamida 955mg) + Pegfilgrastim 6mg. Ciclos: 6 cada 21 días.	
29	53	157	65	1,66	26,37	Ady	FEC-90 → Docetaxel + Trastuzumab → Trastuzumab FEC (Fluorouracilo 996mg + Epirubicina 149,40mg + ciclofosfamida 996mg) + Filgrastim 300mcg. Ciclos: 4 cada 21 días. Docetaxel 166mg + Trastuzumab 520mg + Filgrastim 300mcg. Ciclos 4 cada 21 días. A partir del 2º ciclo Docetaxel 132,80mg + Trastuzumab 390mg + Filgrastim 300mcg. Trastuzumab 360mg. Ciclo: 14 cada 21 días.	Reducción docetaxel 2º ciclo
30	55	161	69	1,73	26,61	Ady	FEC-90 → Docetaxel + Trastuzumab → Trastuzumab Régimen FEC-90 (Fluorouracilo 1026mg + Epirubicina 153,90mg + ciclofosfamida 1026mg) + Filgrastim 300mcg. Ciclos: 4 cada 21 días. Ciclo 3º aplazamiento 5 semanas Docetaxel 129,75mg + Trastuzumab 552/414mgmg + Filgrastim 300mcg. Ciclos 4 cada 21 días. Trastuzumab 414mg 14 ciclos cada 21 días.	Aplazamiento
31	53	170	77	1,88	26,64	Ady	TAC (Docetaxel 141mg + Adriamicina 94mg + Ciclofosfamida 940mg) + Pegfilgrastim 6mg. Ciclos: 6 cada 21 días.	
32	61	172	79	1,9	26,70	Ady	TAC (Docetaxel 142,50mg + Adriamicina 95mg + Ciclofosfamida 950mg) + Pegfilgrastim 6mg. Ciclos: 6 cada 21 días, excepto 2º ciclo 26 días.	Aplazamiento
33	76	156	65	1,65	26,70	Ady	FEC → Paclitaxel FEC-60 (Ciclofosfamida 996mg + Epirubicina 99,60mg + fluorouracilo 996mg.4 ciclo cada 21 días, excepto 2ºciclo a los 28 días.	Reducción dosis inicial Aplazamiento

							Paclitaxel 132mg + Filgrastim300mcg. 10 ciclos cada 7 días.	
34	67	151	61	1,57	26,75	Neo	TAC (Docetaxel 123mg + Adriamicina 82mg + Ciclofosfamida 820mg) + Pegfilgrastim 6mg. Ciclos: 6 cada 21 días. Reducción 6ºciclo (Docetaxel 117,75mg + Adriamicina 78,5mg + Ciclofosfamida 785mg)	Reducción 6º ciclo
35	50	165	73	1,8	26,81	Ady	TAC (Docetaxel 135mg + Adriamicina 90mg + Ciclofosfamida 900mg) + Pegfilgrastim 6mg. Ciclos: 6 cada 21 días. A partir del 5º ciclo reducción de dosis (Docetaxel 121,5mg + Adriamicina 81mg + Ciclofosfamida 810mg)	Reducción 5ºciclo Recaída en 2018
36	39	179	86	2,05	26,84	neo	Placitaxel -> FEC-75 Placitaxel albumina EC 307,50mg. Ciclos: 7semanales FEC-75 (ciclofosfamida 1230mg + epirubicina 153,75mg + fluorouracilo 1230mg) + Filgrastim 300mcg. Ciclo: 6 ciclos cada 14 días- 2º ciclo se sube Epirubicina a 184,50mg (FEC-90)→ esquema acelerado	Recaída en 2014
37	71	156	66	1,66	27,12	ady	TC (Docetaxel 124,50mg + ciclofosfamida 996mg + Filgrastim 300mcg). 1 ciclo	
38	54	159	69	1,7	27,29	neo	TAC x 6 cada 21 días (Docetaxel 127,50mg + Adriamicina 85mg + Ciclofosfamida 850mg) + Pegfilgrastim 6mg. 6º Ciclo reducción Docetaxel a 114,75mg	Reducción posterior
39	51	160	70	1,7	27,34	neo	TAC x 6 cada 21 días (Docetaxel 127,50mg + Adriamicina 85mg + Ciclofosfamida 850mg) + Pegfilgrastim 6mg. 6º ciclo reducción (Docetaxel 114mg + Adriamicina 76mg + Ciclofosfamida 765mg)	Reducción posterior
40	-	175	84	2	27,42	Ady	-	Varón, excluido
41	56	163	73	1,79	27,47	Ady	TC + Trastuzumab →Trastuzumab	

							TC + Trastuzumab x 6 cada 21 días (Docetaxel 134,25mg + Ciclofosfamida 1.074mg+ Trastuzumab 584mg; 438mg) + Filgrastim 300mcg Trastuzumab 438mg x12 cada 21 días	
42	75	149	61	1,55	27,47	Ady	Régimen TC x 6 cada 21 días (Docetaxel 118,50mg+ Ciclofosfamida 948mg) + pegfilgrastim 6mcg x 6	En 2015 recaída
43	65	144	57	1,47	27,48	Ady	Régimen TAC x 6 cada 21 días (Ciclofosfamida 735mg + Adriamicina 73,50mg + Docetaxel 110,25mg) + pegfilgrastim 6mcg	
44	63	156	67	1,67	27,53	Neo	Régimen TAC x 6 cada 21 días (Ciclofosfamida 835mg + Adriamicina 83,50mg + Docetaxel 125,25mg) + pegfilgrastim 6mcg	
45		156	67	1,67	27,53		No historia	Fallecido
46	49	159	70	1,72	27,68	Ady	TC x 6 cada 21 días (Docetaxel 129mg + Ciclofosfamida 1032mg) + Filgrastim 300mcg	
47	73	152	64	1,61	27,70	Ady	EC → Docetaxel 80 EC x 4 cada 21 días (Ciclofosfamida 1008mg + Epirubicina 126mg) + Filgrastim 300mcg Docetaxel 126mg + Filgrastim 300mcg x4 cada 21 días	En 2015 metástasis
48	54	172	82	1,95	27,71	Ady	TAC x 6 trisemanal (Ciclofosfamida 975mg + Adriamicina 97,50mg + Docetaxel 146,25mg) + Pegfilgrastim 6mcg	
49	54	150	63	1,58	28	Ady	TAC x 6 trisemanal (Ciclofosfamida 790mg + Adriamicina 79mg + Docetaxel 118,5mg) + Filgrastim 300mcg	
50	54	158	70	1,72	28,04	Ady	Régimen FEC-90 → Docetaxel + Trastuzumab → Trastuzumab FEC x 4 cada 21 días (Fluorouracilo 960mg + Epirubicina 144mg + ciclofosfamida 960mg) + Filgrastim 300mcg.	Reducción inicial

							Docetaxel 160mg + Trastuzumab 489/360mg + Filgrastim 300mcg x 3 cada 21 días Trastuzumab 420mg trisemanal hasta completar año	
51	47	161	73	1,77	28,16	Neo	Paclitaxel → FEC-90 Paclitaxel 266,50mg x 12 trisemanal FEC x 4 trisemanal (Fluorouracilo 1.062mg + Epirubicina 159,3mg + Ciclofosfamida 1.062mg) + Pegfilgrastim 6mcg	
52	48	162	74	1,79	28,19	Ady	TAC x 6 cada 21 días (Docetaxel 134,25mg + Adriamicina 89,5mg + Ciclofosfamida 895mg) + Filgrastim 300mcg	
53	65	163	75	1,8	28,22	Neo	TAC x 6 cada 21 días (Docetaxel 135mg + Adriamicina 90mg + Ciclofosfamida 900mg) + Pegfilgrastim 6mg	
54	65	164	76	1,8	28,25	Neo	TAC x 6 cada 21 días (Docetaxel 135mg + Adriamicina 90mg + Ciclofosfamida 900mg) + Pegfilgrastim 6mg	
55	78	157	70	1,71	28,39	Neo	Docetaxel + Trastuzumab → Trastuzumab Docetaxel 136mg + Trastuzumab 592/444mg + Pegfilgrastim x 6 cada 21 días. 2º ciclo reducción Docetaxel a 127mg. 4º ciclo reducción Docetaxel a 115mg y Trastuzumab 432mg. Trastuzumab 420mg hasta completar año	Reducción 2ºciclo
56	67	161	74	1,78	28,54	Ady	FEC-90 → Docetaxel + Trastuzumab + Pertuzumab FEC x 4 trisemanal (Fluorouracilo 1.068mg + Epirubicina 160,20mg + Ciclofosfamida 1.068mg) + Filgrastim 300mcg Docetaxel 133,50mg + Pertuzumab 840/420mg + Trastuzumab 592/444mg + Filgrastim 300mcg x 4 trisemanal	

							Trastuzumab 444mg + Pertuzumab 420mg trisemanal hasta completar año	
57	53	162	75	1,8	28,57	Ady	TC (Docetaxel 135mg + Ciclofosfamida 1080mg) + Filgrastim 300mcg. A partir del 2º ciclo reducción: Docetaxel 114,75mg + Ciclofosfamida 918mg.	Reducción a partir del 2ºciclo de un 15%
58	79	154	68	1,66	28,67	Ady	Trastuzumab 544/408mg x 10 cada 21 días → no quimioterapia	Excluido
59	81	155	69	1,68	28,72	Ady	Régimen FEC → Paclitaxel FEC x 4 cada 21 días (Ciclofosfamida 835mg + Epirubicina 100,20mg + Fluorouracilo 835mg). Subida 2º ciclo Epirubicina a 125,25mg Paclitaxel 134,40mg x 8 semanal	
60	60	161	75	1,79	28,93	Ady	TC (Ciclofosfamida 895mg + Docetaxel 134,25mg) + Filgrastim 300mcg x 6 trisemanal	
61	57	161	75	1,79	28,93	Ady	FEC-90 → Paclitaxel + Trastuzumab → Trastuzumab FEC x 4 trisemanal (Ciclofosfamida 1080mg + Epirubicina 162mg + Fluorouracilo 1.080mg) + Filgrastim 300mcg Paclitaxel 144mg + Trastuzumab 304mg/152mg x 8 semanal Trastuzumab 450mg hasta completar el año	
62	62	151	66	1,62	28,94	Ady	FEC-75 → Paclitaxel FEC x4 trisemanal (Ciclofosfamida 972mg + Epirubicina 121,50mg + Fluorouracilo 972mg) Paclitaxel 129,60mg x 8 semanal	
63	55	153	67,9	1,6	29	Ady	FEC-90 → Paclitaxel FEC x3 trisemanal (Ciclofosfamida 960mg + Epirubicina 144mg + Fluorouracilo 960mg) Paclitaxel 128mg x 8 semanal	
64	77	168	82	1,92	29,05	Ady	FEC-75 → Paclitaxel FEC x4 trisemanal (Ciclofosfamida 1.140mg + Epirubicina 142mg + Fluorouracilo 1.140mg) Paclitaxel 153,60mg x 8 semanal	

65	52	169	83	1,94	29,06	Ady	FEC-75 → Paclitaxel FEC x4 trisemanal (Ciclofosfamida 1.194mg + Epirubicina 149,25mg + Fluorouracilo 1.194mg) Paclitaxel 155,20mg x 8 semanal	
66	74	154	69	1,67	29,09	Neo	FEC-90 → Paclitaxel 80 EC x4 trisemanal (Ciclofosfamida 1.002mg + Epirubicina 150,3mg + Fluorouracilo 1.002mg) + Filgrastim 300mcg Paclitaxel 133,60mg x 8 semanal	
67	56	160	75	1,78	29,29	Ady	TC x 4 trisemanal (Docetaxel 133,50mg + Ciclofosfamida 1.068mg) + Filgrastim 300mcg	
68	55	168	83	1,93	29,40	Ady	FEC-85 → Docetaxel + Trastuzumab → Trastuzumab FEC x4 trisemanal (Ciclofosfamida 1.098mg + Epirubicina 164,70mg + Fluorouracilo 1.098mg) + Pegfilgrastim 6mg Docetaxel 139mg + Trastuzumab 600/450mg + Pegfilgrastim 6mcg x 4 trisemanal Trastuzumab 498mg trisemanal hasta completar un año	Reducción dosis inicial
69	60	169	84	1,95	29,41	ady	TAC x 6 cada 21 días (Docetaxel 146,25mg + Adriamicina 97,5mg + Ciclofosfamida 975mg) + Pegfilgrastim 6mg	
70	49	171	86	1,98	29,41	neo	Paclitaxel → FEC-90 Paclitaxel 295,50mg x 12 cada 7/14 días FEC 90 x 4 cada 21 días (Ciclofosfamida 1.188mg + Epirubicina 178,20mg + Fluorouracilo 1.188mg) + Filgrastim 480mcg	
71	63	154	70	1,68	29,51	ady	FEC90 → Docetaxel FEC-90 x 4 cada 21 días (Ciclofosfamida 1.026mg + Epirubicina 153,90mg + Fluorouracilo 1.026mg) + Filgrastim 300mcg Docetaxel 126mg x 4 cada 21 días	

73	66	155	71	1,7	29,55	Ady	TC x 4 cada 21 días (Docetaxel 127,50mg + Ciclofosfamida 1020mg) + Filgrastim 300mcg	
74	68	155	71	1,7	29,55	Ady	TC x 6 cada 21 días (Docetaxel 127,50mg + Ciclofosfamida 1020mg) + Pegfilgrastim 6mg. 6º Ciclo dado a los 28 días con reducción de dosis (Docetaxel 114,70mg + Ciclofosfamida 918mg) + Pegfilgrastim 6mg	Reducción dosis 10% posterior
75	62	156	72	1,72	29,58	Ady	TC x 6 cada 21 días (Docetaxel 129mg + Ciclofosfamida 1.032mg) + Pegfilgrastim 6mg	
76	78	163	79	1,85	29,73	Ady	Paclitaxel + Trastuzumab → Trastuzumab Paclitaxel 150,40mg + Trastuzumab 492mg Paclitaxel 135mg x 8 1,8 y 15 cada 28 días Trastuzumab 316mg x3. 1º y 2º dosis cada 14 días Trastuzumab 300mg hasta completar año	Reducción posterior
77	-	156	72,4	1,7	29,75	Neo	No historia	Fallecido
78	78	154	71	1,69	29,93	Ady	FEC-75 → Paclitaxel + Trastuzumab → Trastuzumab FEC-75 (Ciclofosfamida 1.008mg + Epirubicina 126mg + fluorouracilo 1.008mg) Paclitaxel 101,4mg x 2 cada 14 días; 135,20mg x 6 cada 7 días. Trastuzumab 284/142mg x 9 semanal Trastuzumab 426mg hasta completar año	Reducción inicial

Tabla 12. Variables de los pacientes con sobrepeso. Información recogida del programa de prescripción electrónica y HospiWin.

ANEXO IV. VARIABLES PACIENTES CON OBESIDAD

PACIENTES CON OBESIDAD (IMC $\geq$ 30 KG/M ²)								
Nº	Edad	Talla	Peso	SC	IMC	QT	Régimen	Observaciones
1	77	157	74	1,75	30,02	Ady	FEC-75 → Paclitaxel FEC-75 x 4 cada 21 días (Ciclofosfamida 1.050mg + Epirubicina clorhidrato 131,25mg + Fluorouracilo 1.050mg) Placitaxel 140mg x 8 semanales.	
2	59	162	79	1,84	30,10	Ady	TAC x 6 cada 21 días. (Ciclofosfamida 920mg + Adriamicina 92mg + Docetaxel 138mg) + Pegfilgrastim 6mg.	
3	70	149	68	1,62	30,62	Ady	Paclitaxel 129,60mg x 11 1,8 Y 15º cada 28 días	
4	81	151	70	1,66	30,70	Ady	Paclitaxel 99,60mg x2 semanal → 132,80mg x8 semanal	Reducción dosis inicial
5	46	153	72	1,7	30,75	Neo	FEC → Docetaxel FEC x 4 cada 21 días (Ciclofosfamida 996mg + Epirubicina 149,40mg + Fluorouracilo 996mg) Docetaxel 136mg + Filgrastim 300mcg x4 cada 21 días	Reducción dosis iniciales
6	71	154	73	1,71	30,78	neo	TAC x 6 cada 21 días (ciclofosfamida 855mg + adriamicina 85,50mg + docetaxel 128,25) + pegfilgrastim 6mg. Reducción a partir del 2º ciclo (Ciclofosfamida 769,5mg + Adriamicina 76,95 mg + Docetaxel 114,57)	Reducción 2º ciclo un 10%
7	53	160	79	1,82	30,85	ady	FEC-90 → Paclitaxel FEC-90 x4 cada 21 días (Ciclofosfamida 1.092mg + Epirubicina 163,80mg + Fluorouracilo 1.092mg) + Filgrastim 300mcg. Reducción a partir de 2º ciclo (Ciclofosfamida	Reducción de dosis un 10% a partir del 2º ciclo

							982,80mg + Epirubicina 147,42mg + Fluorouracilo 982,80mg) Paclitaxel 145,60 x 8 semanal	
8	63	146	66	1,58	30,96	ady	Régimen TC (Docetaxel 118,50mg + Ciclofosfamida 948mg) + Filgrastim 300mcg. Reducción a partir dosis 3º ciclo (Docetaxel 106,65mg + Ciclofosfamida 853,20mg) + Pegfilgrastim 6mg.	Reducción dosis 3º ciclo
9	55	151	71	1,67	31,13	ady	FEC-90 → Docetaxel 75 FEC x 4 cada 21 días (Ciclofosfamida 996mg + Epirubicina 149,40mg + Fluorouracilo 996mg) + Filgrastim 300mcg Docetaxel 125,25mg x3 cada 21 días	
10	64	154	74	1,72	31,20	ady	FEC-90 → Docetaxel + Trastuzumab → Trastuzumab FEC-90 x 4 cada 21 días (Ciclofosfamida 1008mg + Epirubicina 151,20mg + Fluorouracilo 1008mg) + Filgrastim 300mcg Docetaxel 137,60mg + Trastuzumab 592mg/444mg x4 cada 21 días Trastuzumab 444mg x13 cada 21 días	
11	63	158	78	1,8	31,24	neo	FEC-90 → Docetaxel 100+Trastuzumab → Trastuzumab FEC-90 x 4 cada 21 días (Ciclofosfamida 1.080mg + Epirubicina 162mg + Fluorouracilo 1.080mg). Aplazamiento 2º ciclo 28 días. Docetaxel 180mg + Trastuzumab 624/468 x 5 cada 21 días Trastuzumab 468mg x13 cada 21 días	Aplazamiento

12	69	155	76	1,75	31,63	Neo	TC + Trastuzumab → Trastuzumab TC + Trastuzumab x 5 cada 21 días (docetaxel 131,25mg + ciclofosfamida 1.050mg + trastuzumab 608/456mg) + Filgastrim 300mcg Trastuzumab 456mg x13 cada 21 días	
13	-	167	90	1,99	32,27	Neo	No historia	Fallecido
14	53	175	99	2,14	32,32	Ady	TC + Trastuzumab → Trastuzumab TC + Trastuzumab x 5 cada 21 días (Docetaxel 160,5mg + Ciclofosfamida 1.284mg + Trastuzumab 792/594mg) + Filgrastim 480mcg Trastuzumab 594mg x 12	
15	70	159	82	1,84	32,43	ady	TC (Docetaxel 138mg + Ciclofosfamida 1.104mg) + Pegfilgrastim 6mg → 21 días → Reducción : docetaxel 117,30mg + ciclofosfamida 938,40mg + filgrastim 300mcg x 2 mensual → 4º ciclo reducción (Docetaxel 105,58mg + Ciclofosfamida 844,56mg)	Reducción de dosis en el 2º y 4º ciclo
16	43	168	92	2,02	32,59	neo	Docetaxel + Trastuzumab → Trastuzumab Docetaxel 188mg + Trastuzumab 624/468 mg + Pegfilgrastim 6 mg x 6 cada 21 días (A partir del 5º ciclo reducción docetaxel 169,2mg) Trastuzumab 468mg x6 cada 21 días.	Reducción dosis inicial Reducción posterior
17	86	149	73	1,6	32,88	Ady	Placitaxel + Trastuzumab → Trastuzumab Paclitaxel 128mg x 12 cada 7/14 días + Trastuzumab 438mg/292mg x9 cada 14 días Trastuzumab 441mg x10 trisemanal	
18	64	151	75	1,7	32,89	Neo	FEC-75 → Docetaxel + Trastuzumab → Trastuzumab	

							FEC x 4 cada 21 días (Ciclofosfamida 1.020mg + Epirubicina 127,50mg + Fluorouracilo 1.020mg) Docetaxel 127,5mg + Trastuzumab 600mg/450mg + Filgrastim 300 x 4 cada 21 días. Trastuzumab 450mg x14 trisemanal	
19	54	152	76	1,73	32,89	ady	TC x 4 cada 21 días (docetaxel 129,75mg + ciclofosfamida 1.038mg) + Pegfilgrastim 6mg	
20	52	157	81,8	1,82	33,18	ady	TAC x 5 cada 21 días (Ciclofosfamida 910mg + Adriamicina 91mg + Docetaxel 136mg) + Pegfilgrastim 6mg	
21	52	155	80	1,79	33,29		TAC x 6 cada 21 días (Ciclofosfamida 895mg + Adriamicina 89,50mg + Docetaxel 134,25mg) + Pegfilgrastim 6mg	
22	39	161	88	1,92	33,94	neo	Adriamicina → Paclitaxel → CMF → GC Adriamicina 46mg x 6 cada 24 horas. Placitaxel 147,20mg x 10 semanal	Excluida, embarazada
23	86	140	67	1,54	34,18	neo	TC x 4 cada 21 días (Docetaxel 115,5mg + Ciclofosfamida 924mg) + Filgrastim 300mcg	
24	56	168	100	2,09	35,43	ady	FEC-90 → Docetaxel + Trastuzumab + Pertuzumab → Trastuzumab + Pertuzumab FEC x 4 cada 21 días (ciclofosfamida 1.206mg + epirubicina 180,90mg + fluorouracilo 1.206mg) Docetaxel 151,50mg + Trastuzumab 744/558 mg + Pertuzumab E.C 840/420mg + Filgastrim 300mcg x4 cada 21 días Trastuzumab 558mg + Pertuzumab 420 mg x 14 cada 21 días	Reducción dosis inicial
25	-	152	87	1,8	37,65	Neo	No disponible	Fallecida

26	63	160	98	2	38,28	ady	FEC-75 → Docetaxel FEC-75 x4 cada 21 días (Ciclofosfamida 1.200mg + Epirubicina 150mg + Fluorouracilo 1.200mg) Docetaxel 150mg + Filgastrim 300mcg x 4 cada 21 días	no
27	54	158	96	1,96	38,45	ady	FEC-90 → Docetaxel FEC x 4 cada 21 días (ciclofosfamida 1.176mg + epirubicina 176,40mg + fluorouracilo 1.176mg) Docetaxel 156,80mg + Pegfilgastrim 6mg x4 cada 21 días	no
28	65	160	99	2,01	38,67	ady	FEC-90 → Docetaxel + Trastuzumab + Pertuzumab → Trastuzumab + Pertuzumab FEC-90 x3 cada 21 días (ciclofosfamida 1.206mg + epirubicina clorhidrato 180,90 + fluoracilo 1.206mg) Trastuzumab 792/594mg + Pertuzumab E.C 840/420mg + Docetaxel 150,75mg + Pegfilgastrim 6mg x4 cada 21 días Trastuzumab 594mg + pertuzumab E.C 420mg x 14 cada 21días	no
29	71	173	116	2	38,75	ady	FEC-75 → Docetaxel FEC-75 (ciclofosfamida 1.200mg + epirubicina 150mg + Fluoracilo 1.200mg) x 4 cada 21 días Docetaxel 150 mg + Filgrastim 300mcg x 4 trisemanal	Varón, excluido
30	82	144	86	1,7	41,47	ady	Docetaxel 127mg + Pegfilgastrim 6mg x 6 trisemanal	

Tabla 13. Variables de las pacientes con obesidad. Información recogida del programa de prescripción electrónica y HospiWin