

FAMES	SINTÉTICOS	CONVENCIONALES	FÁRMACO (1)	DIANA	DOSIS	EFFECTOS ADVERSOS	CONTRAINDICACIONES	EMBARAZO
			Metotrexato LEDERLE® (2,5 mg) Comprimidos (vo) NORDIMET® (10; 12,5; 15; 17,5; 20; 22,5; 25 mg): Plumas precargadas (sc)	Vía de síntesis de purinas y pirimidinas	10-25 mg/sem	GI, Neumonitis intersticial aguda	IR o Hepática grave, úlceras, TBC y VIH	No
			Cloroquina RESOCHIN® Comprimido 250 mg (vo) Hidroxicloroquina DOLQUINE® Comprimido 200 mg (vo)	IL, linfocitos T y B, autofagia, TLR	155 mg/día	Retinopatía en ojo de buey	Daño visual, hematológicas, déficit G6PDH, miastenia	No
					200-400 g/día			Sí
			D-Penicilamina TROLOVOL® (vo) (19) Comprimido recubierto 300 mg	Receptores superficie linfocitos T, FR	300-900 mg/día	Cutáneos, renales, GI, hematológicos	IR o alteraciones graves hematopoyéticas	No
			Sales de Oro MIOCRIN® (IM) (21)	Linfocitos y macrófagos	10-50 mg/sem	Toxicidad mucocutánea	IR o hepática graves, Hematológicas	No
			Leflunomida ARAVA® (vo): Comprimidos 10, 20 mg.	Pirimidinas	10-20 mg/día	GI, HTA, neuropatía, cutáneas	IR o hepática, inmunosupresión, hematológicas, infecciones, hipoproteinemia grave	No
			Sulfasalazina SALAZOPYRINA® (vo) Comprimido 500 mg.	Linfocitos	2-3 g/día	GI, mucocutáneas, infertilidad	Hipersensibilidad AAS, varones deseo genésico	Sí
			Ciclosporina A SANDIMMUN NEORAL® Comprimidos (vo) 25,50,100mg. Solución oral 100 mg/ml.	Linfocitos T e IL-2	2,5-5 mg/kg/día	HTA e IR	HTA mal controlada, IR, infecciones, Inmunosupresión	No

	Azatioprina IMUREL® (vo) Comprimido recubierto de 50 mg. Vial liofilizado de 50 mg.	Ácidos nucleicos	1,5-2,5 mg/kg/día	GI, hematológicas	Insuficiencia hepática o medular graves, infecciones, pancreatitis.	No
	Ciclofosfamida GENOXAL® Comprimido de 50 mg (vo) Ampolla IV 1000 mg. Ampolla IV 200 mg.	Citotóxica	1,5-2,5 mg/kg/día 3-6 mg/kg/día	Mielosupresión, infertilidad	Insuficiencia hepática, neoplasias previas	No
FAMES BIOLÓGICOS	Infliximab REMICADE®, INFLECTRA®, REMSIMA®, FLIXABI® Vial liofilizado 100 mg. (IV)	Anti-TNFα	3-7,5 mg/kg	Reacción local, infecciones, cefalea, GI	IC NYHA III-IV	No
	Adalimumab HUMIRA® (sc) Jeringa precargada 40 mg Pluma precargada 40 mg.	Anti-TNFα	40 mg/14 días	Reacción local, infecciones, leucopenia, etc	infección grave, IC moderada-grave	Sí 2ª línea
	Etanercept ENBREL®, BENEPALI®, ERELZY® (sc) Jeringa/pluma precargada 50 mg	Anti-TNFα (parte soluble)	50 mg/sem	Reacción local, infecciones	infección grave, IC moderada-grave	No
	Golimumab SIMPONI® (sc) Jeringa precargada 50 mg. Pluma precargada 50 mg.	Anti-TNFα (dos formas activas)	50-100 mg/mes	Reacción local, infecciones	infección grave, IC moderada-grave	No
	Certolizumab CIMZIA® (sc) Jeringa precargada 200 mg. Pluma precargada de 200 mg.	Anti-TNFα	200-400 mg	Reacción local, infecciones, cefalea, HTA, Etc	infección grave, IC moderada-grave	Sí 1ª línea
	Anakinra KINERET® (sc): Jeringa 100 mg	IL-1R	100 mg/día	Reacción local, cefalea, neutropenia, etc	Neutropenia, CrCl <30, infecciones graves	No

	Tocilizumab ROACTEMRA® Viales 80, 200 y 400 ml. (IV) Jeringa precargada de 162 mg/semana. (sc)	IL-6R	4-8 mg/kg 162 mg/sem	Neutropenia, dislipidemia, perforación GI	Infecciones graves	No
	Sarilumab KEVZARA®(sc) Jeringas/ plumas precargadas 150 mg y 200 mg	IL-6R	200 mg/2 sem	Neutropenia, dislipidemia, GI	Infecciones graves	No
	Rituximab MABTHERA® (IV): Viales 100 y 500 mg. TRUXIMA® (IV): Viales 100 y 500 mg	linfocitos B (CD20)	1.000 mg	Reacción local, infecciones, disminución IgM, reactivación VHB	Infecciones o IC graves	No
	Abatacept ORENCIA® Vial liofilizado 250 mg (IV) Jeringa precargada 125 mg Pluma precargada 125 mg(sc)	CPA (CD28)	Dosis- peso 500-1000 mg	Infecciones, cefalea, rash	Infecciones graves	No
JAKi	Tofacitinib XELJANZ®: Comp. 5 mg. (vo)	JAK1 y JAK3	2,5-5 mg/12h	Infecciones (HVZ), CPNM, hematológicos, TEV	Child-Pugh C	No
	Baricitinib OLUMIANT®: Comp. 2, 4 mg. (vo)	JAK1 y JAK2	2-4 mg/día	Infecciones (HVZ), CPNM, hematológicos, TEV	CrCl <30 o insuficiencia hepática grave	No
	Upadacitinib RINVOQ®: Comp. 15 mg. (vo) (42)	JAK1 o JAK1/3	15 mg/día	Infecciones (HVZ), CPNM, hematológicas, TEV	IR o hepática graves	No
	Filgotinib JYSELECA®: Comp. 200 mg. (vo) (48)	JAK1	100-200 mg/día	Infecciones, CPNM, hematológicas, TEV	IR o hepática graves	No

*GI: gastrointestinal, IR: insuficiencia renal, IC: insuficiencia cardiaca, ACO: anticoncepción, CrCl: aclaramiento creatinina, HVZ: virus herpes zóster, CPNM: cáncer de piel no melanoma, TEV: trombo-embolismo venoso, vo: vía oral, sc: subcutáneo, IV: intravenoso.