

ANEXOS

Anexo I:

Criterios de la Sociedad internacional de Trombosis y hemostasia para sangrado en pacientes no quirúrgicos

- Sangrado fatal
- Sangrado sintomático en un área u órgano critico:
 - Sangrado intracraneal
 - Sangrado intraespinal
 - Sangrado intraocular
 - Sangrado retroperitoneal
 - Hemopericardio
 - Sangrado intramuscular asociado a síndrome compartimental
- Sangrado que produzca una caída de la hemoglobina de mas de 2 g/dl o la necesidad de transfusión de mas de 2 concentrados de hematíes o sangre total.

Anexo II:

Criterios de sangrado de Gusto

- Sangrado mayor: Sangrado que ocasione deterioro hemodinámico y requiera una intervención para detenerlo.
- Sangrado moderado: Sangrado que requiere transfusión pero no produce deterioro hemodinámico.
- Sangrado leve: El que no cumple los criterios ni de mayor ni de moderado.

Anexo III: Tabla de chi cuadrado para la variable INR lábil en pacientes con una complicación isquémica e indicación de ACO

Tabla de contingencia ACO * INR lábil

		INR lábil		Total
		0	1	
ACO	0	46	2	48
	% dentro de INR lábil	76,7%	13,3%	64,0%
	1	14	13	27
Total	% dentro de INR lábil	23,3%	86,7%	36,0%
	Recuento	60	15	75
	% dentro de INR lábil	100,0%	100,0%	100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Sig. asintótica (bilateral)	Sig. exacta (bilateral)	Sig. exacta (unilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	20,891 ^a	1	,000		
Corrección por continuidad ^b	18,233	1	,000		
Razón de verosimilitudes	21,040	1	,000		
Estadístico exacto de Fisher				,000	,000
Asociación lineal por lineal	20,613	1	,000		
N de casos válidos		75			

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,40.

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

Anexo IV: Tabla de chi cuadrado para la variable edad mayor de 75 años en pacientes con una complicación isquémica e indicación de ACO

Tabla de contingencia ACO * EDADRECODI2

		EDADRECODI2		Total
		Menores de 75 años	De 75 ó mas años	
ACO	0	Recuento	2	48
	0	% dentro de EDADRECODI2	33,3%	66,7%
	1	Recuento	4	27
	1	% dentro de EDADRECODI2	66,7%	33,3%
	Total	Recuento	6	75
	Total	% dentro de EDADRECODI2	100,0%	100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Sig. asintótica (bilateral)	Sig. exacta (bilateral)	Sig. exacta (unilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	2,662 ^a	1	,103		
Corrección por continuidad ^b	1,412	1	,235		
Razón de verosimilitudes					
Estadístico exacto de Fisher	2,536	1	,111	,180	,119
Asociación lineal por lineal	2,627	1	,105		
N de casos válidos	75				

a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,16.

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

Anexo V: Tabla de chi cuadrado para la variable uso de AINES, Antiagregantes o corticoides en pacientes con una complicación isquémica e indicación de ACO

Tabla de contingencia ACO * Uso de Drogas

		Uso de Drogas		Total
		0	1	
ACO	0	Recuento	22	48
	0	% dentro de Uso de Drogas	46,8%	92,9%
	1	Recuento	25	27
	1	% dentro de Uso de Drogas	53,2%	7,1%
Total		Recuento	47	75
		% dentro de Uso de Drogas	100,0%	100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Sig. asintótica (bilateral)	Sig. exacta (bilateral)	Sig. exacta (unilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	16,149 ^a	1	,000		
Corrección por continuidad ^b	14,212	1	,000		
Razón de verosimilitudes	18,639	1	,000		
Estadístico exacto de Fisher				,000	,000
Asociación lineal por lineal	15,934	1	,000		
N de casos válidos	75				

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 10,08.

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2.