

ANEXOS

Tabla 1. Variables cualitativas

| Característica | Nº | % |
|--------------------------|-----------|----------|
| <i>Total Pacientes</i> | 287 | 100.0 |
| <i>Tipo histológico</i> | | |
| Intraductal | 28 | 9.75 |
| Ductal Infiltrante | 240 | 83.62 |
| Lobulillar | 18 | 6.27 |
| Basal-Like | 1 | 0.34 |
| <i>Tamaño Mama</i> | | |
| Grande | 59 | 21 |
| Medio | 198 | 69 |
| Pequeña | 30 | 10 |
| <i>Palpable</i> | | |
| Si | 171 | 59.58 |
| No | 116 | 40.41 |
| <i>Resultado AP</i> | | |
| Macro | 54 | 18.81 |
| Micro | 42 | 14.63 |
| ITC | 15 | 5.22 |
| Negativo | 163 | 56.79 |
| Fallo Técnico | 13 | 4.52 |
| <i>Tipo de Inyección</i> | | |
| Profunda | 123 | 42.85 |
| Superficial | 164 | 57.14 |
| <i>Reinyección</i> | | |
| Si | 55 | 19.16 |
| No | 232 | 80.83 |

Tabla 2. Variables cuantitativas

| Característica | \bar{x} | s | Max | Min |
|--------------------------|-----------|-------|-----|-----|
| <i>Edad (años)</i> | 60.2 | 13.86 | 89 | 26 |
| <i>Tamaño AP (mm)</i> | 18.21 | 13.61 | 100 | 1 |
| <i>Ganglios Axilares</i> | 1.63 | | 8 | 0 |
| <i>Ganglios Cirugía</i> | 1.58 | | | |

Tabla 3. Ganglios Mammaia Interna

| Gánglios Mammaia Interna | Muestra | Nº | % |
|--------------------------|---------|----|-------|
| Total | 287 | 24 | 8.4 |
| Profunda | 123 | 18 | 14.63 |
| Superficial | 164 | 6 | 3.6 |
| Abordados | 24 | 12 | 44 |
| Estudio AP | 12 | 4 | 33.33 |
| Positivo | 4 | 2 | 50 |
| Negativo | 4 | 2 | 50 |
| Positivo Total | 287 | 2 | 0.7 |

Tabla 4. Parámetros estadísticos de No Migración de las diferentes variables a estudio

| Variable (n) | Nº 287 | Migración | | | Parámetro | | |
|-----------------------|-----------|-----------|----|-----------------------|---------------|--------------|------------|
| | | Si | No | % No Migración (IC95) | RR | RAR (%) | NNT |
| <i>Inyección</i> | | | | | | | |
| Profunda | 123 | 90 | 33 | 26,82 (19,7 – 35,2) | 1,91 | 12,8 | 7,8 |
| Superficial | 164 | 141 | 23 | 14,02 (9,5 – 20,1) | (1,18 – 3,08) | (3,4 – 22,3) | (5 – 29) |
| <i>Tamaño</i> | | | | | | | |
| Grande | 59 | 43 | 16 | 27,11 (17,4 – 39,5) | 1,54 | 9,5 | 10,4 |
| No Grande | 228 | 188 | 40 | 17,55 (13,1 – 23) | (0,93 – 2,55) | (-1,5 – 22) | (4 – ∞) |
| <i>Edad (años)</i> | | | | | | | |
| ≥65 | 119 | 96 | 23 | 19,33 (13,2 – 27,3) | 0,98 | 0,3 | 317,3 |
| <65 | 168 | 135 | 33 | 19,64 (14,3 – 26,3) | (0,61 – 1,58) | (-8 – 10) | (10 – ∞) |
| <i>Resultado AP</i> | | | | | | | |
| Macro | 60 | 44 | 16 | 26,66 (14,8 – 43,1) | 1,51 | 9 | 11,1 |
| Resto | 227 | 187 | 40 | 17,6 (12 – 25) | (0,91 – 2,5) | (-2 – 22) | (5 – ∞) |
| <i>Tamaño AP (cm)</i> | | | | | | | |
| ≥ 20 | 83 | 64 | 19 | 22,89 (15 – 33) | 1,22 | 4 | 23,5 |
| <20 | 161 | 131 | 30 | 18,63 (13,1 – 25,23) | (0,73 – 2,04) | (-6 – 15) | (6 – ∞) |

Tabla 5. Desglose variables a estudio según tipo de inyección.

| Factores | Profunda (n:123) | | Superficial (n:164) | |
|-----------------------------|------------------|-------|---------------------|-------|
| | X | s | X | S |
| <i>Edad</i> | 60.16 | 13.87 | 60.28 | 13.84 |
| <i>Tamaño AP (mm)</i> | 18.23 | 13.63 | 18.26 | 13.79 |
| | Profunda % | | Superficial % | |
| <i>Tamaño mama (Grande)</i> | 18.69 | | 22 | |
| <i>Resultado AP (Macro)</i> | 21.13 | | 20.73 | |
| <i>No Migración</i> | 26.82 | | 14.02 | |

Tabla 6. Parámetros estadísticos de No Migración en inyección profunda

| Variable (n) | Nº | Migración | | | Parámetro | | |
|-----------------------|-------------|-----------|----|-----------------------|---------------|------------|---------|
| | | Si | No | % No Migración (IC95) | RR | RAR (%) | NNT |
| PROFUNDA | 123 | | | | | | |
| <i>Tamaño</i> | | | | | | | |
| Grande | 23 | 17 | 6 | 26.08 | 0.97 | -1 | 110 |
| No Grande | 100 | 73 | 27 | 27 | (0.45 – 2.07) | (-19 – 21) | (5 – ∞) |
| <i>Edad (años)</i> | | | | | | | |
| ≥65 | 43 | 32 | 11 | 25.58 | 0.93 | -2 | 52 |
| <65 | 80 | 58 | 22 | 27.5 | (0.50 – 1.73) | (-14 – 18) | (5 – ∞) |
| <i>Resultado AP</i> | | | | | | | |
| Macro | 26 | 18 | 8 | 30.77 (13.5 – 55.8) | 1.19 | -5 | 20 |
| Resto | 97 | 72 | 25 | 25.77 (16 – 38.4) | (0.61 – 2.33) | (-25 – 15) | (7 – ∞) |
| <i>Tamaño AP (cm)</i> | 107* | | | | | | |
| ≥ 20 | 33 | 23 | 10 | 30.3 (17.3 – 47.3) | 1.18 | -5 | 22 |
| <20 | 74 | 55 | 19 | 25.68 (17 – 36.6) | (0.62 – 2.25) | (-23 – 14) | (7 – ∞) |

* No se incluyen Tis

Tabla 7. Parámetros estadísticos de No Migración en inyección superficial

| Variable (n) | Nº | Migración | | | Parámetro | | |
|-----------------------|-------------|-----------|----|-----------------------|---------------|--------------|----------|
| | | Si | No | % No Migración (IC95) | RR | RAR (%) | NNT |
| <i>SUPERFICIAL</i> | 164 | | | | | | |
| <i>Tamaño</i> | | | | | | | |
| Grande | 36 | 26 | 10 | 27.77 | 2.74 | -18 | 6 |
| No Grande | 128 | 115 | 13 | 10.15 | (1.31 – 5.71) | (-19 – (-2)) | (3 – 48) |
| <i>Edad (años)</i> | | | | | | | |
| ≥65 | 76 | 64 | 12 | 15.78 | 1.26 | -3 | 30 |
| <65 | 88 | 77 | 11 | 12.5 | (0.59 – 2.70) | (-14 – 7) | (13 – ∞) |
| <i>Resultado AP</i> | | | | | | | |
| Macro | 34 | 26 | 8 | 23.53 (10.1 – 45.5) | 2.04 | -12 | 8 |
| Resto | 130 | 115 | 15 | 11.54 (6.1 – 20.6) | (0.94 – 4.41) | (-27 – 3) | (3 – ∞) |
| <i>Tamaño AP (cm)</i> | 137* | | | | | | |
| ≥ 20 | 50 | 41 | 9 | 18 (9.7 – 30.7) | 1.42 | -5 | 19 |
| <20 | 87 | 76 | 11 | 12.64 (7.2 – 21.2) | (0.63 – 3.20) | (-18 – 7) | (13 – ∞) |

* No se incluyen Tis

Tabla 8. Costes según tipo de inyección

| Actividad | Inyección | |
|--------------------------|------------------|--------------------|
| | Profunda (n 123) | Superficial (n164) |
| <i>Informe</i> | 15.7 | 15.7 |
| <i>Consulta</i> | 13.9 | 13.9 |
| <i>Quirófano</i> | 144.4 | 144.4 |
| <i>Ficha Técnica</i> | 7.1 | 7.1 |
| <i>Inyección</i> | 37.8 | 37.8 |
| <i>ECO/Mamografía</i> | 30.5 | - |
| <i>Captura de Imagen</i> | 369 | 369 |
| <i>Radiofármaco</i> | 37.8 | 37.8 |
| <i>Total persona</i> | 656,29 | 625,79 |
| <i>Para 100 casos</i> | 65.629 | 62.579 |
| <i>Total inyección</i> | 80.723,67 | 102.629,56 |

| | Reinyección* | |
|--------------------------|-----------------|--------------------|
| | Profunda (n 32) | Superficial (n 23) |
| <i>Informe</i> | - | - |
| <i>Consulta</i> | - | - |
| <i>Quirófano</i> | - | - |
| <i>Ficha Técnica</i> | - | - |
| <i>Inyección</i> | 37,8 | 37,8 |
| <i>ECO/Mamografía</i> | - | - |
| <i>Captura de Imagen</i> | 369 | 369 |
| <i>Radiofármaco</i> | 37,8 | 37,8 |
| <i>Total persona</i> | 444,6 | 444,6 |
| <i>Para 100 casos</i> | 11.559,6** | 6224,4** |
| <i>Total reinyección</i> | 14.227,2 | 10.225,8 |

| | | |
|------------------------|-----------|------------|
| <i>Total muestra</i> | 94.950,87 | 112.855,36 |
| <i>Total 100 casos</i> | 77.188,6 | 68.803,4 |

* En reinyección se realiza siempre técnica superficial

** Se aplica el % de no migración para profunda y superficial (26 y 14%)

