

FE DE ERRATAS

Tesis Doctoral:

“Influencia del grado de funcionalidad en la autoestima en personas con Parálisis Cerebral”

Página libro	Pone	Debería poner
iii	haber creído siempre en <u>mi</u>	haber creído siempre en <u>mí</u>
xiii	puntos (IC 95%= <u>0.016</u> a 0.078, p=0.003)	puntos (IC 95%= <u>0.017</u> a 0.078, p=0.003)
xiii	los <u>25</u> y 45 años que en el grupo de personas con más edad (<u>45-65</u> años) (p= <u>0.048</u>)	los <u>26</u> y 45 años que en el grupo de personas con más edad (<u>46-65</u> años) (p= <u>0.047</u>)
xv	points (95% CI= <u>0.016</u> to 0.078, p=0.003)	points (95% CI= <u>0.017</u> to 0.078, p=0.003)
xv	aged <u>25-45</u> years than in older people (<u>45-65</u> years) (p= <u>0.048</u>).	aged <u>26-45</u> years than in older people (<u>46-65</u> years) (p= <u>0.047</u>).
2	<u>A parte</u> de la afectación motriz, pueden	<u>Aparte</u> de la afectación motriz, pueden
17	El tratamiento de los trastornos motores está basado en cuatro pilares básicos: fisioterapia, terapia ocupacional, uso de órtesis, fármacos y tratamiento quirúrgico (33).	El tratamiento de los trastornos motores está basado en cuatro pilares básicos: fisioterapia y terapia ocupacional, uso de órtesis, fármacos y tratamiento quirúrgico (33).
24	dando por hecho que <u>ellos</u> no pueden ser felices o sentirse bien con <u>ellos</u> mismas	dando por hecho que <u>ellas</u> no pueden ser felices o sentirse bien con <u>ellas</u> mismas
30	Sin embargo, <u>33</u> fueron excluidos en función del título y el resumen	Sin embargo, <u>32</u> fueron excluidos en función del título y el resumen
91	El Intervalo de Confianza al 95% fue de <u>0.016</u> a 0.078	El Intervalo de Confianza al 95% fue de <u>0.017</u> a 0.078
94	Es decir, que la puntuación de la Escala de Autoestima de <u>Barthel</u> depende de las personas con las que convive habitualmente más que de la puntuación del Índice de Barthel.	Es decir, que la puntuación de la Escala de Autoestima de <u>Rosenberg</u> depende de las personas con las que convive habitualmente más que de la puntuación del Índice de Barthel.
99	y el valor-p para la variable " <u>Ansiolíticos</u> " es estadísticamente significativo (p<0.05).	y el valor-p para la variable " <u>Antidepresivos</u> " es estadísticamente significativo (p<0.05).
124	adultos jóvenes (<u>25-45</u> años) y adultos mayores (<u>45-65</u> años).	adultos jóvenes (<u>26-45</u> años) y adultos mayores (<u>46-65</u> años).
128	grupo de adultos jóvenes (<u>25-45</u> años) y adultos mayores (<u>45-65</u> años),	grupo de adultos jóvenes (<u>26-45</u> años) y adultos mayores (<u>46-65</u> años),
140	entre los <u>25</u> y los 45 años que en las de más edad (entre <u>45</u> y 65 años)	entre los <u>26</u> y los 45 años que en las de más edad (entre <u>46</u> y 65 años)

142	ages between <u>25</u> and 45 years than in the older (between <u>45</u> and 65 years)	ages between <u>26</u> and 45 years than in the older (between <u>46</u> and 65 years)
-----	--	--