

## ¿QUÉ ES?

El procedimiento *triple intratecal* se trata de un doble procedimiento, donde se extrae líquido cefalorraquídeo para analizarlo y por la misma vía se administra la quimioterapia.

Su nombre se debe a que se administran 3 quimioterápicos: Metotrexato, Citarabina y Glucocorticoides.

Duración del procedimiento: 15 '

Observación post punción: 2 H en URPA

## ¿CÓMO SE REALIZA?

El procedimiento tiene lugar en quirófano. Se colocará a su hijo en *posición fetal*.

SERÁ NECESARIO LA SEDACIÓN

## POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

- Dolor de cabeza
- Sangrado en el punto de punción
- Náuseas / Vómitos
- Mareo
- Dolor en la espalda

## ¿CÓMO EVITARLOS?

- Mantener al niño tumbado boca arriba durante 4 - 6 horas
- Aumentar la ingesta de líquidos
- Retomar la alimentación de manera progresiva



## ¿SE NECESITA PREPARACIÓN?

El *día de anterior a la intervención* se requerirá estar en *ayunas*.

	Ayunas	Marca X
Neonato	Hasta 5a.m.	
Lactante	Hasta 2a.m. con lactancia artificial	
	Hasta 4 a.m. con lactancia materna	
	Hasta 6 a.m. líquidos claros	
> 1 año	Hasta 12 p.m.	

\*Se administra la medicación habitual salvo indicación específica

El *día de la intervención*, se colocará una *crema anestésica* (EMLA) en la zona donde se realiza la punción para minimizar el dolor post intervención.

OBSERVACIONES								
Nº SESIÓN								
FECHA								

OBSERVACIONES								
Nº SESIÓN								
FECHA								

### Más información:

- ASPANOA (Tel. 976458176)
- Hospital Materno - Infantil (Tel. 976765500 3ª planta)
- Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica ([www.sehop.org](http://www.sehop.org))
- Instituto Nacional de Cáncer (<https://www.cancer.gov/espanol>)

*"Juntos podemos construir un mundo donde el cáncer no signifique más vivir con miedo o sin esperanza"*

Patrick Swayze

**Autora:** Julia Abizanda López

**Email:** [juliaabizanda@gmail.com](mailto:juliaabizanda@gmail.com)



## ¿QUÉ DEBO SABER SOBRE EL PROCEDIMIENTO TRIPLE INTRATECAL?



Paciente: \_\_\_\_\_

Pediatra: \_\_\_\_\_